

Flow Chart การดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยา
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลตอยเต่า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยดื้อยาอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

| <u>ชื่อผู้รับผิดชอบ</u> | <u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</u> | <u>จุดควบคุมความเสี่ยง</u> | <u>ระยะเวลา</u> |
|--|------------------------------------|---|-----------------|
| เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย | ตามผล C/S พบเชื้อดื้อยา | <ul style="list-style-type: none"> - แยกผู้ป่วย+อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันที - อธิบายการปฏิบัติตัวให้ผู้ป่วยและญาติ - ติดป้าย precaution ที่เตียงผู้ป่วย และAlert สีแดง ติดชาร์จ - ทำ Pop Up ในระบบ Hosxp - เตรียมถังขยะติดเชื้อที่เตียงผู้ป่วย | 10 นาที |
| เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย | การดูแลขณะนอนในโรงพยาบาล | <ul style="list-style-type: none"> - สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการแพร่กระจายเชื่อนั้นๆ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยดื้อยา | 10 นาที |
| เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย หน่วยงานภายนอก | การส่งต่อนอกหน่วยงาน เช่น X-Ray | <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งหน่วยงานปลายทางทราบก่อนทุกครั้ง - ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทุกครั้งหลังผู้ป่วยสัมผัส | 10 นาที |
| เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย | การทำความสะอาด | <ul style="list-style-type: none"> - สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลตามมาตรฐาน - ใช้น้ำยาทำลายเชื้อโดยไม่ทำให้เกิดละอองฝอย | 10 นาที |

รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ 40 นาที

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางกุสุมา ยศใจ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่